


ПРОФИЛАКТИКА

Профилактику заболевания следует начинать как можно раньше.



В случае укуса или даже ослюнения человека любым животным необходимо срочно обратиться к врачу-хирургу (травматологу) и получить профилактическое лечение от бешенства, в том числе профилактические прививки.



ПОМНИТЕ!

**ЗАБОЛЕВАНИЕ БЕШЕНСТВОМ
НЕЛЬЗЯ ВЫЛЕЧИТЬ,
НО МОЖНО ПРЕДУПРЕДИТЬ!**

Автор: А.С.Калитюк



Министерство здравоохранения Республики Беларусь
Филиал Брестская городская детская поликлиника №2
УЗ "Брестская центральная поликлиника"
УЗ "Брестская центральная городская больница"

Брест - 2013

ОАО «БТ» ААХ2 Т. 2000 экз. Зех. 5469-2013 г. ПЭ 022/00000170 от 01.04.2008 г.

БЕШЕНСТВО СМЕРТЕЛЬНО ОПАСНО!



Предупредить можно,



вылечить – нельзя.

БЕШЕНСТВО –

острое вирусное заболевание, протекающее с тяжелым поражением центральной нервной системы и заканчивающееся смертью. Случаи излечения от бешенства не зарегистрированы.




Основными источниками инфекции

являются дикие хищные звери и домашние животные (лисы, волки, еноты, собаки, кошки, хомяки, шакалы, грызуны), выделяющие вирус со слюной.

Заражение животных и человека

происходит при укусе или ослюнении больным (бешеным) животным поврежденных кожных покровов и слизистых оболочек.

От человека к человеку вирус не передается.



Животные в начале заболевания становятся агрессивными и раздражительными. Потом поведение их становится неадекватным, появляются понос, рвота, обильное слюноотделение, происходит отказ от пищи и питья, вода вызывает спазм мышц гортани. **Через 3-5 дней животное гибнет.**

Развитие заболевания у человека

В течение длительного времени (**от 10 дней до 1 года**) после заражения может не наблюдаться никаких признаков заболевания.

Первыми признаками болезни являются тянущие боли в месте укуса и по ходу нервов, жжение, повышенная чувствительность кожи. Рубец на месте укуса становится болезненным, температура тела повышается до 38 °С.

Появляются головная боль, тревога, бессонница, страшные сновидения, тоска, раздражительность, депрессия, замкнутость. Отмечаются сухость во рту, отсутствие аппетита, повышенная потливость.



Это состояние длится 1-3 дня.

Затем появляется гидрофобия (водобоязнь). При попытке пить, при виде воды, звуке льющейся воды у больного возникает болезненное судорожное сокращение мышц глотки и гортани, дыхание становится шумным, может быть обильная рвота с желчью, икота. Затем наступает паралич мышц и смертельный исход.

